



striatura

fioccosità

volva

**Regno:** Fungi

**Divisione:** Eumycota

**Classe:** Basidiomycetes

**Ordine:** Amanitales

**Famiglia:** Amanitaceae

**Genere:** Amanita

**Sottogenere:** Amanitopsis

**Specie:** Amanita vaginata (Bull.: Fr.) Vittadini -

**Etimologia:** dal latino vaginatus = protetto da guaina

**Sinonimi :** Amanitopsis vaginata (Bull.) Roze; Amanitopsis plumbea (Schaeff.) J. Schröt.; Amanitopsis albida (Bull.) S. Imai; Amanita violacea Jacz.; Amanita livida Pers.

**Volgare:** Bubbola minore,

**Cappello:** 40-70 mm, prima campanulato, poi convesso, infine aperto, grigio beige, grigio-perla ; in genere nudo, raramente con qualche residuo di velo generale sotto forma di placche bianche; con umbone ottuso, finemente striato al bordo.

**Lamelle:** bianche, fitte e libere, intercalate da lamellule.

**Gambo:** 65-120 x 10-22 mm, fragile, assottigliato verso l'alto, prima pieno, poi cavo, liscio oppure fioccoso, bianco o leggermente argenteo, un po' ingrossato alla base, con volva persistente aderente nella parte basale, libera all'orlo; privo di anello.

**Carne:** bianca, tenera, di sapore gradevole.

**Spore:** bianche in massa, non amiloidi, da sub globose a globose, 10-12 x 9,6 -11,6.

**Habitat:** fungo simbiote, ubiquitario, presente soprattutto nelle radure dei boschi di latifoglie e nei prati, in estate-autunno.

**Commestibile:** commestibile dopo cottura.

**Note:** La presenza di striature al margine del cappello e l'assenza dell'anello la distinguono facilmente dalle Amanite mortali. Di questo sottogenere Amanitopsis vi sono parecchie specie, varietà o forme, che si distinguono soprattutto per il colore del cappello (var. alba, var. argentea, var. plumbea).